

**NUEVO**

# Colotrin<sup>®</sup> inyectable

Condroitín sulfato  
de alta pureza

▶ **16%**  
(160 mg /ml)



La **Enfermedad Articular Degenerativa (EAD)** es muy frecuente en caninos y felinos.

Prevenirla y tratarla es de vital importancia.



+ El **condroitín sulfato** es el glicosaminoglicano más abundante en el cartílago articular.

+ Se encuentra unido a proteínas formando **proteoglicanos**.

+ Colotrin inyectable aporta CS en concentraciones terapéuticas y con alta biodisponibilidad retardando el avance de la **EAD**, lo que mejora la calidad de vida.

**1** + Recupera el cartílago articular, actuando directamente en la reparación estructural.


**3** + Restaura la fisiología articular normal recuperando el movimiento y aliviando el dolor.

**2** + Antiinflamatorio natural. Inhibe las enzimas proteolíticas que degradan el cartílago.


**4** + Retarda la degradación articular.

**Colotrin**, cambia la historia de la **artrosis**.

## ARTROSIS EN EL PERRO



## ARTROSIS EN EL GATO



La **EAD** se origina debido a diferentes factores:

- + **Alteraciones genéticas** que determinan enfermedades ortopédicas del desarrollo (displasia de cadera, displasia de codo, osteocondrosis disecante, degeneración no traumática de ligamento cruzado superior).
- + **Traumatismos** que pueden desencadenar procesos de artrosis.
- + **Vejez**: A partir de los 6-7 años, dependiendo de la raza y peso pueden comenzar a verse alteraciones osteoarticulares por envejecimiento.
- + **Sobrepeso**.
- + **Dieta desbalanceada**.
- + **Ejercicio en exceso o indebido**.

El diagnóstico de la **EAD** en el **felino** es un gran desafío. Estudios recientes demuestran que el **90% de los felinos domésticos mayores de 12 años presenta signos de degeneración articular** (Hardie et al 2002) (Lacelle et al). Incluso algunos comienzan desde los 6 meses.



john-martin.com.ar

JOHN MARTIN S.R.L.

Timoteo Gordillo 2460 (C1440EEX) Buenos Aires / Argentina  
Tel. +5411 4687.6128 / info@john-martin.com.ar

## DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

**1 ml de Colotrin inyectable es equivalente a 160 mg de Condroitín sulfato.**

Caninos y Felinos (por vía SC o IM)



**Hasta 10 Kg de peso vivo:**

1 ml (Equivalente a 160 mg de Condroitín sulfato).

**De 10 a 30 Kg de peso vivo:**

2 ml (Equivalente a 320 mg de Condroitín sulfato).

Las aplicaciones pueden iniciarse con un intervalo de 48-72 hs para luego realizarse 1 vez por semana con un promedio de 10 aplicaciones totales.

En todos los casos, el intervalo de aplicación y la duración del tratamiento dependerán del criterio del Veterinario actuante.

**NUEVO**

**Condroitín sulfato  
de alta pureza**

**16%**  
(160 mg/ml)



**PRESENTACIÓN**  
Frasco ampolla x 10 ml



Laboratoriojohnmartin

*John  
Martin*