



Principales ectoparásitos de los caninos.



Ácaros

Sarcoptes scabiei:

Responsable de la sarna sarcóptica. Generalmente toma las partes ventrales del cuerpo y es altamente pruriginosa. **Es una zoonosis.**

Demodex spp:

Responsable de la demodicosis. No es contagiosa, ni pruriginosa. Se observa en raspajes profundos de folículos pilosos.

Otodectes cynotis:

También llamado ácaro del oído, pero puede observarse en otras áreas del cuerpo (cuello, rabo). Visible in situ con otoscopio. Es responsable de la sarna otodéctica, muy molesta.




Pulgas

Ctenocephalides felis:

La pulga de mayor prevalencia en caninos y felinos. Actúa como huésped intermediario (HI) de agentes como *Dypilidium caninum*.

Ctenocephalides canis:

Similar a *C. felis* pero de cabeza más corta. También actúa como HI de *Dypilidium caninum*.



Garrapatas

Rhipicephalus sanguineus sensu lato:

También conocida como garrapata marrón del perro, la de mayor prevalencia en esta especie. Visible a ojo desnudo.

Transmite otros agentes como *Erlchia canis*, *Hepatozoon canis*, *Mycoplasma haemocanis*, *Babesia vogeli* y *Anaplasma platys*.