Meloxivet®
comprimidos

UN COMPROMISO CON LA SALUD ANIMAL

Meloxicam 4 mg

COMPOSICIÓN:

Meloxicam	**4 mg**
Excipientes c.sp.	**150 mg**

10 COMP

100 COMP

CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA

Antiinflamatorio no esteroide.

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimidos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

INDICACIONES DE USO

Para tratamiento del dolor e inflamación asociados a osteoartrosis, miositis, tenosinovitis, patologías músculotendinosas, patologías ligamentosas, panoesteítis, y para el tratamiento de mialgias.

Indicado para el tratamiento de la inflamación y del dolor postquirúrgicos (ortopédicos y de tejidos blandos).

Cuando el sangrado es de importancia, meloxicam puede tener mínimo o ningún efecto debido a la falta de actividad antitromboxano.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

El producto se administra por vía oral.

Caninos:

Dosis de ataque de 0.2 mg/kg el primer día. Luego administrar una dosis de 0.1 mg/kg cada 24 hs.

Felinos:

Dosis de 0.1 mg/kg/24 hs por 3 a 5 días y luego 0.1 mg totales cada 24-72 hs.

CONTRAINDICACIONES - EFECTOS ADVERSOS

El producto no debe ser administrado en animales con disfunción hepática y/o renal, desórdenes de coagulación, enfermedad cardiovascular, animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, con ulceración o sangrado gastrointestinal. Tampoco debe administrarse a animales con sensibilidad conocida al meloxicam, al piroxicam, a la aspirina o a otros AINES, o a cualquier excipiente de la droga.

No utilizar en animales en gestación o lactación. No administrar en cachorros de menos de 8 semanas de edad.

Los efectos adversos más comunes incluyen vómitos, diarrea, inapetencia, melena, hematemesis y ulceración gastrointestinal. Menos frecuentemente puede observarse ataxia, cambios de personalidad, convulsiones, hiperactividad, somnolencia, depresión y letargia en cachorros, prurito, eccema, alopecia focal, parche caliente, piodermia y dermatitis alérgica.
El meloxicam presenta interacciones con anticoagulantes, otros AINES, antiinflamatorios esteroidales, diuréticos y medicaciones nefrotóxicas. Las sustancias con alta afinidad a las proteínas pueden competir por la unión y así producir efectos tóxicos.

PRECAUCIONES DE USO

En casos de sobredosis debe iniciarse un tratamiento sintomático, acompañado con fluidoterapia. Los síntomas por intoxicación incluyen vómitos, diarrea, inapetencia, melena, hematemesis, ulceración gastrointestinal y letargia. Pueden presentarse convulsiones así como compromiso renal y/o hepático. En casos de autoadministración accidental consulte rápidamente a su médico. No existe antídoto específico.

ADVERTENCIAS

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0800-333-0160** (Argentina)
NO UTILIZAR FUERA DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.
MANTENER AL ABRIGO DE LA LUZ.
Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación vigente.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 1 blíster x 10 comprimidos.
Envase conteniendo 10 blísters x 10 comprimidos cada uno.

CONTENIDO NETO:

10 comprimidos.
100 comprimidos.

CONSERVACIÓN

Conservar en su envase original entre 15°C y 25°C, al abrigo de la luz y la humedad. No almacenar por encima de 25°C.

VENTA CON RECETA VETERINARIA

Uso veterinario

Industria Argentina

JOHN MARTIN S.R.L.
Timoteo Gordillo 2460 (C1440EEX) CABA - Argentina
Tel: (011) 4687-6128 - info@john-martin.com.ar

D.T. Laura B. Omodeo
Farm. M.Nº 9135
SENASA Cert. Nº: 07-018
Est. Elab. Nº 8473

john-martin.com.ar
3716.3