

Antiinflamatorio no esteroide

---

## COMPOSICIÓN

Meloxicam

0,5 mg

Excipientes c.s.p.

1 ml



10  
ML 

## CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA:

Antiinflamatorio no esteroide.

## FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión saborizada. Gotas.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Exclusivamente oral.

## INDICACIONES DE USO

Para tratamiento del dolor e inflamación asociados a osteoartrosis, miositis, tenosinovitis, patologías musculotendinosas, patologías ligamentosas, panoesteítis, y para el tratamiento de mialgias. Indicado para el tratamiento de la inflamación y del dolor postquirúrgicos (ortopédicos y de tejidos blandos).

Cuando el sangrado es de importancia, meloxicam puede tener mínimo o ningún efecto debido a la falta de actividad antitromboxano.

## **ESPECIES DE DESTINO**

Caninos y felinos.

## **DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO**

El producto se administra por vía oral.

**Caninos:** dosis de ataque de 0.2 mg/kg el primer día. Luego administrar una dosis de 0.1 mg/kg cada 24 hs.

**Felinos:** dosis de 0.1 mg/kg/24 hs por 3 a 5 días y luego 0.1 mg totales cada 24-72 hs.

## **AGITAR BIEN ANTES DE ADMINISTRAR**

25 gotas = 1 ml.

## **CONTRAINDICACIONES - EFECTOS ADVERSOS**

El producto no debe ser administrado en animales con disfunción hepática y/o renal, desórdenes de coagulación, enfermedad cardiovascular, animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, con ulceración o sangrado gastrointestinal. Tampoco debe administrarse a animales con sensibilidad conocida al meloxicam, al piroxicam, a la aspirina o a otros AINES, o a cualquier excipiente de la droga.

No utilizar en animales en gestación o lactación. No administrar en cachorros de menos de 8 semanas de edad.

Los efectos adversos más comunes incluyen vómitos, diarrea, inapetencia, melena, hematemesis y ulceración gastrointestinal. Menos frecuentemente puede observarse ataxia, cambios de personalidad, convulsiones, hiperactividad, somnolencia, depresión y letargia en cachorros, prurito, eccema, alopecia focal, parche caliente, piodermia y dermatitis alérgica. El meloxicam presenta interacciones con anticoagulantes, otros AINES, antiinflamatorios esteroidales, diuréticos y medicaciones nefrotóxicas. Las sustancias con alta afinidad a las proteínas pueden competir por la unión y así producir efectos tóxicos.

## **PRECAUCIONES DE USO**

En casos de sobredosis debe iniciarse un tratamiento sintomático, acompañado con fluidoterapia. En casos de autoadministración accidental consulte rápidamente a su médico. No existe antidoto específico.

## **ADVERTENCIAS**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0800-333-0160 (Argentina)**

**NO UTILIZAR FUERA DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.**

MANTENER AL ABRIGO DE LA LUZ.

## **PRESENTACIÓN**

Envase conteniendo un frasco gotero.

## **CONTENIDO NETO**

10 ml.

## **PERÍODO DE VALIDEZ**

2 años a partir de la fecha de elaboración.

## **CONSERVACIÓN**

Conservar en su envase original entre 15°C y 25°C. No almacenar por encima de 25°C.

## **VENTA BAJO RECETA VETERINARIA**

Uso veterinario

Industria Argentina

## Importa y distribuye:

En **ECUADOR**: Registro AGROCALIDAD N°: RIP-02-FAR-00114

En **PANAMÁ**: Reg. MIDA N° MV-6460

En **PARAGUAY**: SENACSA Cert. N° 15.995

En **PERÚ**: SENASA PERÚ: F.99.02.I.0013

En **REP. DOMINICANA**: Reg. N° 12242

En **URUGUAY**: Reg. DILAVE N° A-5275

**JOHN MARTIN S.R.L.**

Timoteo Gordillo 2460 (C1440EEX) CABA - Argentina

Tel: (011) 4687-6128 – info@john-martin.com.ar

D.T. Laura B. Omodeo

Farm. M. N° 9135

SENASA Cert. N°: 06-393

Est. Elab. N° 6927

