

coagulación, enfermedad cardiovascular, animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, con ulceración o sangrado gastrointestinal. Tampoco debe administrarse a animales con sensibilidad conocida al meloxicam, al piroxicam, a la aspirina o a otros AINES, o a cualquier excipiente de la droga. No utilizar en animales en gestación o lactación.

No administrar en cachorros de menos de 8 semanas de edad ni en gatitos de menos de 2 kg de peso. Los efectos adversos más comunes induyen vómitos, diarrea, inapetencia, melena, hematemesis y ulceración gastrointestinal. Con mucha menos frecuencia puede observarse ataxia, cambios de personalidad, convulsiones, hiperactividad, somnolencia, depresión y letargia en cachorros, prurito, eccema, alopecia focal, parche caliente, piodermia y dermatitis alérgica.

El meloxicam presenta interacciones con anticoagulantes, otros AINES, antiinflamatorios esteroideos, diuréticos y medicaciones nefrotóxicas. Las sustancias con alta afinidad a las proteínas pueden competir por la unión y así producir efectos tóxicos.

PRECAUCIONES DE USO

En casos de sobredosis debe iniciarse un tratamiento sintomático, acompañado con fluidoterapia. En casos de autoadministración accidental consulte rápidamente a su médico. No existe antidoto específico.

ADVERTENCIAS

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

NO UTILIZAR FUERA DE SU FECHA DE VENCIMIENTO

MANTENER AL ABRIGO DE LA LUZ

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo un frasco ampolla con 10 ml de solución.

CONSERVACIÓN

Conservar el producto entre 15° y 25°C y al abrigo de la luz.

LOS ENVASES UTILIZADOS DEBERÁN SER DESCARTADOS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN LOCAL VIGENTE.

VENTA BAJO RECETA

Importa y distribuye:

En **PANAMÁ**: Reg. MIDA N° MV-6475. En **PARAGUAY**: SENACSA Cert. 15.994. En **PERÚ**: DEXER SRL - SENASA Perú F.99.01.I.0022. En **URUGUAY**: Reg. DILAVE N° A-5279.

JOHN MARTIN S.R.L.

Timoteo Gordillo 2460 (C1440EEX) CABA - Argentina

Tel: (011) 4687-6128 - info@john-martin.com.ar

REG MAG AR 52-14-08-5014

D.T. Laura B. Omodeo

Farm. M.N° 9135

SENASA Cert. N°: 10-053

Est. Hab. N° 6927

john-martin.com.ar

3718.3



Meloxivet[®]

inyectable

Antiinflamatorio no Esteroide



COMPOSICIÓN

Meloxicam

5 mg

Agentes de formulación c.s.p.

1 ml

Uso Veterinario

Industria Argentina



10 ML

INDICACIONES DE USO

MELOXIVET Inyectable está indicado para el tratamiento de la inflamación y del dolor intra y postquirúrgicos (ortopédicos y de tejidos blandos) pudiendo utilizarse en la premedicación anestésica con un alto margen de seguridad. Reduce el estrés quirúrgico y la cantidad de anestesia necesaria durante la cirugía. Cuando el sangrado es de importancia, meloxicam puede tener mínimo o ningún efecto debido a la falta de actividad antitromboxano.

También puede utilizarse MELOXIVET Inyectable para el tratamiento del dolor y de la inflamación asociados a osteoartritis, miositis, tenosinovitis, patologías musculotendinosas, patologías ligamentosas, panoestefitis, y para el tratamiento de mialgias.

ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

El producto se administra por vía subcutánea.

Caninos: Dosis de ataque de 0.2 mg/kg el primer día y como tratamiento del dolor y la inflamación postquirúrgica en la premedicación. Luego de 24 horas puede continuarse el tratamiento con MELOXIVET Gotas administrando una dosis de 0.1 mg/kg cada 24 horas.

Duración máxima de tratamiento continuado es de 10 días.

Felinos: Para el tratamiento del dolor postquirúrgico puede aplicarse una primer dosis en la premedicación de 0.3 mg/kg y 24 hs después aplicar 0.1 mg totales o continuar el tratamiento analgésico con MELOXIVET Gotas administrando 0.1 mg/kg/24 hs por 3 a 5 días y luego 0.1 mg totales cada 24-72 hs (titulando la dosis) según lo requiera el caso. Duración máxima de tratamiento continuado es de 10 días.

AGITAR BIEN ANTES DE ADMINISTRAR

CONTRAINDICACIONES EFECTOS ADVERSOS

El producto no debe ser administrado en animales con disfunción hepática y/o renal, desórdenes de