Ranitidina

John Martin comprimidos

UN COMPROMISO CON LA SALUD ANIMAL

COMPOSICIÓN

Ranitidina clorhidrato	**50 mg**
Excipientes c.s.p.	**300 mg**

10 COMP

100 COMP

CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA
Antiulceroso.

FORMA FARMACÉUTICA
Comprimidos.

VIA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

INDICACIONES DE USO
Uso en caninos y felinos. Para el tratamiento de la gastritis y úlcera gástrica o duodenal. Dado que inhibe la secreción de ácido a nivel del estómago, está indicado en todos los casos en que deba disminuirse la acidez estomacal.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
Los comprimidos se administran por vía oral, directamente en la boca o mezclados con el alimento.
Caninos: 2 mg/kg de peso vivo cada 12 horas, lo que equivale a 1 comprimido cada 25 kg de peso cada 12 horas.
Felinos: 3,5 mg/kg de peso vivo cada 12 horas, lo que equivale a 1/4 de comprimido cada 3 kg de peso cada 12 horas.
La duración del tratamiento dependerá de la gravedad de los síntomas. Una alternativa es iniciar el tratamiento por vía parenteral y continuar la dosificación por vía oral.
La dosis y el tratamiento quedan a criterio del Médico Veterinario interviniente.

CONTRAINDICACIONES
Si bien se han descrito varios efectos secundarios en humanos, los mismos no han sido comprobados en animales. Un efecto rebote, con hipersecreción de ácido gástrico puede observarse en algunos animales luego de suprimir la administración de la droga, especialmente en casos de úlceras.
La supresión de ácido gástrico por antagonistas de los receptores H2, resulta en un incremento en la concentración plasmática de gastrina, 3 horas después de la administración de una dosis. La subsecuente estimulación de las células G de la mucosa gástrica produce una hipersecreción de ácido gástrico, la que se evidencia cuando se discontinúa la droga.
La probabilidad de hipersecreción está condicionada al incremento de la sensibilidad de los receptores de las células parietales que aparentemente caracteriza a los pacientes afectados por úlceras.

ADVERTENCIAS
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0800-333-0160 (Argentina)**
NO UTILIZAR FUERA DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.
Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación vigente.

PRESENTACIÓN
Envase conteniendo 1 blíster de 10 comprimidos.
Envase conteniendo 100 comprimidos (10 blísters x 10).

CONTENIDO NETO
10 comprimidos.
100 comprimidos.

CONSERVACIÓN
Conservar en su envase original entre 15ºC y 25ºc. No almacenar por encima de 25°C.

VENTA CON RECETA VETERINARIA
Uso Veterinario
Industria Argentina

JOHN MARTIN S.R.L.
Timoteo Gordillo 2460 (C1440EEX) CABA - Argentina
Tel/Fax: (011) 4687-6128 - info@john-martin.com.ar

D.T. Laura B. Omodeo
Farm. M. Nº 9135
SENASA Cert. N°: 99.221
Est. Elab. N° 8473

3745.1

john-martin.com.ar