

Ranitidina

John Martin

gotas

SABORIZADAS

Antiácido

Ranitidina 10 mg/ml

FÓRMULA

Ranitidina (como clorhidrato)
Excipientes c.s.p.

1 g
100 ml

Uso Veterinario
Industria Argentina



30
ML

INDICACIONES DE USO

La Ranitidina es un antagonista de los receptores H2 que inhibe la secreción de ácido gástrico. Está indicada en perros y gatos para la prevención, control y tratamiento de gastritis, úlceras gástricas o duodenales, esofagitis por reflujo, reflujo gastroduodenal, gastritis erosiva inducida por drogas, gastrinomas secretorios y mastocitomas. Dado que inhibe la secreción de ácido gástrico, es útil en todos los casos en que deba disminuirse la acidez estomacal.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

El producto se administra por vía oral.

Perros: 2 mg/kg, equivalente a 1 ml cada 5 kilos. Administrar cada 12 horas.

Gatos: 2 - 3,5 mg/ kg equivalentes a 1-2 ml cada 5 kg. Administrar cada 12 horas.

25 gotas de producto corresponden a 1ml (10 mg) .

La duración del tratamiento dependerá de la gravedad de los síntomas.

Se recomienda iniciar el tratamiento por vía parenteral para luego continuar por vía oral.

La dosis y duración del tratamiento podrán modificarse según criterio del Médico Veterinario interviniente.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

La Ranitidina está contraindicada en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a la misma.

La administración de Ranitidina con otros antiácidos debe estar separada por al menos dos horas cuando se administran vía oral.

El uso en pacientes con insuficiencia renal debe ser monitoreado, podrá requerirse la modificación del intervalo posológico, con administración cada 24 hs.

No administrar en hembras gestantes ni hembras en lactación ya que puede pasar vía leche a los cachorros neonatos.

No administrar en cachorros ni gatitos menores a 4 meses.

La administración de Ranitidina por períodos prolongados puede disminuir la absorción de vitamina B12.

Un efecto de rebote, con hipersecreción de ácido gástrico, puede observarse en algunos animales luego de suprimir el tratamiento, especialmente en casos de úlceras.

ADVERTENCIAS

No existe antídoto específico. En caso de intoxicación accidental realizar tratamiento sintomático.

CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:

0800-333-0160

NO USAR FUERA DE SU FECHA DE VENCIMIENTO

PRESENTACIÓN

Frasco gotero conteniendo 30 ml.

CONSERVACIÓN

Conservar en su envase original, entre 15°C y 30°C

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

VENTA BAJO RECETA

JOHN MARTIN S.R.L.

Timoteo Gordillo 2460 (C1440EEX) CABA - Argentina

Tel/Fax: (011) 4687-6128 - info@john-martin.com.ar

D.T. Laura B. Omodeo

Farm. M.º 9135

SENASA Cert. N.º 21-089

Est. Elab. N.º 6927

