

# Cephilexine

John Martin

comprimidos



Antibiótico. Comprimidos ranurados.

## COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Cefalexina (como Monohidrato)

**500 mg**

Excipientes c.s.p.

## Uso Veterinario

**Industria Argentina**

Para caninos y felinos.



**50**  
COMP 

## DESCRIPCIÓN

Las Cefalosporinas son antibióticos derivados de la cefalosporina C, un antibiótico natural producido por el hongo CEPHALOSPORIUM ACREMONIUM.

Se destaca entre estas la Cefalexina por ser ácido estable de absorción oral y que logra mayores niveles plasmáticos que los obtenidos con cefalosporinas de primera generación de administración parenteral.

La Cefalexina tiene amplia distribución en la mayoría de los tejidos y líquidos corporales, siendo apropiada para el tratamiento sistémico de diversas infecciones bacterianas, respiratorias, urinarias, del tracto genital, osteoarticulares y piel que afectan a caninos y felinos.

Es eficaz frente a gérmenes penicilino-resistentes, grampositivos y gramnegativos: Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Proteus sp., E. Coli. Bacteroides, Klebsiella sp., Pseudomona sp. y Enterobacter sp.

## INDICACIONES

Infecciones de piel, tejidos blandos, osteoarticulares, otitis (con tímpano perforado), vías respiratorias y genitourinarias.

## ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración: oral.

Caninos y felinos: 20-30 mg/kg cada 8/12 h.

1 comprimido cada 20 kg como dosis promedio. En caninos menores a 20 kg de peso y en felinos se recomienda  $\frac{1}{4}$  de comprimido cada 5 k.p.v.

De elección en tratamientos prolongados de dermatopatías infecciosas por más de 30 días.

En Piodermias Superficiales: se sugiere continuar la administración 7-10 días luego de la desaparición de la dermatitis.

En Piodermias Profundas: se sugiere continuar la administración 14-21 días luego de la desaparición de la dermatitis.

Antibiótico de baja toxicidad (DL50 aguda oral en ratas 5 g/kg).

### **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES**

Las cefalosporinas están contraindicadas en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a las mismas. Los antibióticos sistémicos orales no deben ser administrados en pacientes con septicemia, shock, u otras enfermedades graves en donde se vea comprometida la absorción intestinal del antibiótico.

No administrar a pacientes con insuficiencia renal, ya que la principal vía de eliminación es por la orina y puede causar acumulación.

### **EFFECTOS ADVERSOS**

Cuando se administra la cefalexina vía oral, ésta puede causar efectos gastrointestinales por alteración de la flora (anorexia, vómitos, diarrea). La administración de la droga, junto con una pequeña cantidad de alimento, puede aliviar los síntomas. No se aconseja el uso de cefalexina con antibióticos de amplio espectro de reacción bacteriostática, ya que pueden interferir en la acción bactericida de la misma.

### **ADVERTENCIAS**

CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0800-333-0160 (Argentina)**.

**NO UTILIZAR FUERA DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.**

### **PRESENTACIÓN**

Envase conteniendo 50 comprimidos.

### **REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN**

No conservar por encima de 25°C. No exponer a temperaturas de refrigeración. No congelar.

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

### **VENTA CON RECETA VETERINARIA**

El uso de este producto sin un diagnóstico correcto, puede generar resistencia antimicrobiana.

Se deberá respetar la dosis, intervalos y duración del tratamiento.

**JOHN MARTIN S.R.L.**

Timoteo Gordillo 2460 (C1440EEX)

CABA - Argentina

D.T. Laura B. Omodeo

Farm. M. N° 9135

 SENASA Cert. N°: 06-033

 Est. Elab. N° 8500