

Tolzuril

COMPRIMIDOS
SABORIZADOS

Antiprotozoario / Anticoccidiósico

FÓRMULA

Toltrazuril

200 mg

Excipientes c.s.p.

750 mg

Uso Veterinario
Industria Argentina



3
COMP

INDICACIONES DE USO

Preventivo en las coccidiosis subclínicas, sobre todo en cachorros de criadero con antecedentes de la enfermedad y altas cargas parasitarias; y luego del destete con cambio de ambiente.

Terapéutico en coccidiosis intestinal tanto en cachorros como en adultos.

Agentes susceptibles: *C. ohioensis*, *C. burrowsi*, *C. canis*.

También es efectivo en la reducción de la parasitemia y cura de los animales infectados con *Hepatozoon canis*.

Otros protozoarios susceptibles son: *Sarcocystis spp.* y *Neospora caninum*.

DOSIS, MODO Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

La vía de administración es oral.

Control de coccidiosis subclínica:

Cachorros: 10-20 mg/Kg (medio a 1 comprimido por cada 10 Kg de peso) una dosis única en cachorros a partir de 3-4 semanas, ayuda a prevenir los problemas asociados con la coccidiosis intestinal. Los esquemas de repetición del tratamiento deben ser indicados por el profesional veterinario de acuerdo a la situación epidemiológica particular.

Tratamiento de coccidiosis intestinal clínica:

Cachorros y adultos: 20 mg/kg una sola dosis. Puede repetirse la dosis a las 2-3 semanas, según criterio profesional.

Control y tratamiento de hepatozoonosis: 15 mg/Kg (un comprimido por cada 13 Kg de peso) una vez al día, durante 7 días. Las repeticiones del tratamiento dependerán de la evolución y deberá ser indicado por el veterinario.

FORMA FARMACÉUTICA Y DE PRESENTACIÓN

Estuche conteniendo 1 blíster con 3 comprimidos.

Este sistema de envasado le asegura su conservación dentro de la fecha de validez.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN

El toltrazuril no debe utilizarse en animales que han tenido reacciones de hipersensibilidad previas a la misma droga u otras triazinas antiprotozoarias (ponazuril, diclasuril)

El uso en hembras gestantes y lactantes no está recomendado, sin embargo quedará a criterio del Veterinario actuante la decisión de utilizarlo, evaluando los riesgos versus beneficios.

MARGEN DE SEGURIDAD

A la dosis recomendada, el producto posee un alto margen de seguridad.

CONSERVACIÓN

Conservar en su envase original entre 15° a 25°C.

VENTA BAJO RECETA VETERINARIA

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0800-333-0160 (ARGENTINA)**

The logo for John Martin, featuring the brand name in a stylized, cursive script with a horizontal line underneath.

JOHN MARTIN S.R.L.

Timoteo Gordillo 2460 (C1440EEX) CABA - Argentina

Tel: (011) 4687-6128 - info@john-martin.com.ar

D.T. Laura B. Omodeo

Farm. M.º 9135

 SENASA Cert. N°: 18-097

 Est. Elab. Habilitado N° 8473

