




Estadificación de la International Renal Interest Society (IRIS) de la enfermedad renal crónica (ERC).




Estadio 1
Sin azotemia
(creatinina normal)



Estadio 2
Azotemia leve
(creatinina normal o
ligeramente elevada)



Estadio 3
Azotemia moderada



Estadio 4
Azotemia intensa

Creatinina en umol/L Estadio según la creatinina estable.	Menos de 140 (1,6 mg/dL)	140-250 (1,6-2,8 mg/dL)	251 - 440 (2,9-5,0 mg/dL)	Mayor de 440 (5,0 mg/dL)
SDMA en ug/dL Estadio según la SDMA estable.	Menos de 18	18-25	26-38	Mayor de 38
Relación proteína/creatinina en orina.		Sin proteinuria 0,2 Proteinuria en el límite 0,2 - 0,4 Proteinuria 0,4		
Presión arterial sistólica (mm Hg).		Normotenso 140 Prehipertenso 140-159 Hipertenso 160-179 Hipertenso acusado 180		

Fuentes:

International Renal Interest Society (IRIS). IRIS staging system - overview of the IRIS staging system for CKD (2023).

Disponible en: http://www.iris-kidney.com/pdf/2_IRIS_Staging_of_CKD_2023.pdf (ingresado en octubre, 2023).

International Renal Interest Society (IRIS). IRIS CKD Pocket Guide - Treatment recommendations (2023).

Disponible en: http://www.iris-kidney.com/pdf/IRIS_Pocket_Guide_to_CKD_2023.pdf (ingresado en octubre, 2023).