

ANTIPARASITARIO EXTERNO

Pulgicida y garrapaticida para perros. Repele mosquitos y flebótomos. Controla huevos, larvas y adultos.



ATENCIÓN: LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Permetrina

(2,2 dimetil-3-(2,2 diclorovinil)ciclopropil

-1-carboxilato de 3-fenoxibencilo) 50 g

Imidacloprid

(1-(2-doro-5piridilmetil)-2-(nitroimino) imidazolina) 10 g

Piriproxifeno

(4-fenoxifenil (RS)-2-(piridoxil) propileter 2 g

Agentes de formulación c.s.p.

Uso Veterinario
Industria Argentina



DOSIS

4 -10 kg **1,0 ml**

10 -25 kg **2,5 ml**

25 -40 kg **4,0 ml**


40 -60 kg **5,5 ml**



INDICACIONES

Indicado para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas y garrapatas y como repelente de insectos (mosquitos, flebótomos).

FORMA DE USO



- 1** Cortar la punta superior de la pipeta.



- 2** Aplicar el contenido de la pipeta en el lugar indicado.



- 3** Colocar el producto directamente sobre la piel, abriendo el pelaje, en 2 o 3 puntos.

Golpee y sacuda el extremo antes y durante su uso a los efectos de aplicar la totalidad de la dosis. Aplicar una pipeta cada 21 días para el control de *Rhipicephalus sanguineus* (garrapata) y cada 30 días para el de *Ctenocephalides* spp. (pulgas).

PRECAUCIONES

Evitar la ingestión. No beber, fumar o comer durante su aplicación; y luego de la misma lavarse las manos con agua y jabón. Ante el contacto del producto sobre los ojos, lavarse con abundante agua. No almacenar junto a alimentos.

Los recipientes deben incinerarse o enterrarse y no tirarlos en cunetas, arroyos o lagunas, ya que pueden afectar la fauna ictícola y organismos acuáticos.

El producto es tóxico para abejas y animales de sangre fría.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar el producto en Caninos menores de 8 semanas de edad. No utilizar en gatos.

TOXICIDAD

Producto tóxico. En humanos, en caso de ingestión accidental, provocar inmediatamente el vómito, llamar al Médico y/o consultar a los Centros Toxicológicos. En caso de contacto accidental con la piel, lavar con abundante agua y jabón.

En humanos y animales: el riesgo de trastornos tóxicos que pueden manifestarse con incoordinación locomotora, convulsiones, temblores o respiración dificultosa es mínimo.

Antídoto específico no existe. Terapéutica sintomática.

CONSERVACIÓN

Conservar entre 15° y 25°C

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y/O PERSONAS NO AUTORIZADAS.

VENTA LIBRE

(Venta sin receta en locales con asesoramiento profesional veterinario)

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: (54-11) 46587777 / 46546648 / 46583001 / 3020

LÍNEA DE COBRO REVERTIDO: 0800-333-0160

JOHN MARTIN S.R.L.

Timoteo Gordillo 2460 (C1440EEX) CABA - Argentina

Tel/Fax: (011) 4687-6128 - info@john-martin.com.ar

D.T. Laura B. Omodeo

Farm. M.º 9135

SENASA Ext. Cert. N°: 11/184

Est. Elab. N° 8500

