

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Fipronil 10,00 g

Excipientes c.s.p. 100,00 ml

Uso Veterinario
Industria Argentina

DOSIS
0,50 ml



DESCRIPCIÓN

El Fipronil, principio activo del **block! fipro** ejerce su acción por su efecto antagonista del receptor del GABA (ácido γ -amino butírico) inhibiendo el flujo celular de los iones cloro y, por lo tanto, afectando el principal mecanismo neuromodulador de los artrópodos. Así, al ocasionar el aumento de la actividad eléctrica de la célula nerviosa, el Fipronil causa la muerte del parásito por hiperexcitación. Fue demostrado que el Fipronil, prácticamente no tiene afinidad por los canales de cloro de los vertebrados, lo que explica su alta seguridad en los huéspedes (perros y gatos) y en el hombre.

El Fipronil, cuando es aplicado tópicamente, se distribuye rápidamente a través de la epidermis y de las unidades pilo sebáceas, almacenándose en las glándulas sebáceas y posteriormente, es liberado gradualmente vía los conductos foliculares. Esa particularidad del Fipronil garantiza, independientemente de la formulación, su persistencia en altas concentraciones en la cobertura pilosa de los perros, garantizando su eficacia, aun cuando los animales son mojados o bañados.

Los pelos de los animales tratados, al caer al ambiente, ejercen también un significativo control sobre las formas inmaduras. Al ejercer su efecto adulticida por contacto, el Fipronil posibilita que muchas pulgas sean muertas, aun antes de realizar su primera ingestión de sangre, una importante consideración para aquellos animales con dermatitis alérgica por picadura de pulga (DAPP).

INDICACIONES

block! fipro está indicado para el tratamiento, control y prevención de las ectoparasitosis de los gatos, causadas por pulgas (Ctenocephalides felis felis y Ctenocephalides canis).

block! fipro además de poseer un rápido efecto letal en las formas adultas de estos ectoparásitos, tienen un prolongado efecto residual, capaz de mantener a los gatos libres de pulgas hasta 40 días.

block! fipro puede considerarse un importante auxiliar en el control de las infestaciones por cestodos (*Dipylidium caninum*) que parasitan a perros y gatos, ya que las pulgas son huéspedes intermediarios de estos parásitos.

VIA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE USAR

Uso externo, para aplicación directa sobre la piel.

Retirar la tapa de la pipeta y aplicar todo el contenido de la misma, directamente sobre la piel seca del animal, en la región de la nuca o de la cruz, para evitar el lamido del animal. Es importante separar los pelos para facilitar la aplicación del producto sobre la piel y aplicar el mismo en 2 ó 3 puntos en la zona a tratar. Separar el pelo del animal y vaciar el contenido de la pipeta sobre la piel, para evitar el lamido.

No descargar el contenido sobre el pelo.

INTERVALO ENTRE LAS APLICACIONES

block! fipro: el intervalo entre las aplicaciones deberá ser de 40 días para el tratamiento y prevención de la infestación por pulgas.

block! fipro: podrá ser reaplicado a intervalos más cortos, si el animal estuviese en ambientes muy infestados o si padece de dermatitis alérgica a la picadura de pulgas, siempre a criterio del Médico Veterinario.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- La dosis indicada no presenta contraindicaciones ni reacciones adversas.
- El producto puede ser usado con seguridad en hembras en lactación, animales enfermos o debilitados.
- No utilizar en felinos menores de 10 semanas de edad ó con menos de 1 kg. de peso.
- Se recomienda no bañar al animal 48 horas antes o después de aplicar el producto.

ADVERTENCIAS

- Obedecer las dosis y recomendaciones para el uso del producto
- No fumar ni ingerir alimentos o bebidas durante el manoseo del producto.
- La higiene es fundamental, lavar siempre las manos después del uso de cualquier producto veterinario.
- No guardar cerca de los alimentos, bebidas, otros medicamentos, productos de higiene personal o doméstica.
- No tocar a los animales tratados hasta que el producto se seque.
- No reutilizar los envases vacíos, deben ser descartados en la basura domestica.

PRECAUCIONES GENERALES

- Producto moderadamente tóxico.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión accidental provocar el vómito y llamar al médico.
- Los síntomas de intoxicación no son específicos pero pueden ocurrir manifestaciones neurológicas como excitación, temblores o sedación excesiva.
- No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

EVENTUALES EFECTOS SECUNDARIOS

Algunos animales, en caso de lamer el producto, pueden presentar un aumento de la salivación. Este efecto es de corta duración, y es debido a la naturaleza de los excipientes.

PRESENTACIÓN

Pipeta plástica que contiene 0,50 ml

INFORMACIÓN GENERAL

block! fipro puede aplicarse en hembras en lactación y en gestación.

block! fipro puede aplicarse en gatitos a partir de las 10 semanas de edad y cuando tengan un peso superior al kilo .

Se recomienda no bañar al animal 48 horas antes o después de aplicar el producto.

Los baños o aplicación de champúes posteriores a este período, no afectan la acción ni el poder residual del producto.

CONSERVACIÓN

Conservar al abrigo de la luz solar, entre 15°C y 30°C

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES Y ALIMENTOS.

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

VENTA LIBRE

(Venta sin receta en locales con asesoramiento profesional veterinario)

CENTRO DE ATENCIÓN DE REFERENCIA:

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0800-333-0160**

EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA.



JOHN MARTIN S.R.L.

Timoteo Gordillo 2460 (C1440EEX) CABA - Argentina
Tel/Fax: (011) 4687-6128 - info@john-martin.com.ar

D.T. Laura B. Omodeo

Farm. M.º 9135

SENASA Ext. Cert. N.º: 02-271

ESTAB. ELAB. N.º 6804

