



**VADEMÉCUM**

Medicina Integrativa Veterinaria

*John  
Martin*<sup>®</sup>



Nuestra compañía comienza su historia hace **39 años** especializándose en el desarrollo, producción y comercialización de medicamentos exclusivos para animales de compañía.

## + Calidad

Somos la segunda generación en gestión y estamos íntegramente **comprometidos con la innovación y calidad en todas sus formas**, invirtiendo de manera constante para garantizar procesos y procedimientos trazables y seguros.

Para renovar este compromiso con la calidad, somos un laboratorio certificado en buenas prácticas de manufactura bajo **Normas GMP SENASA** Resolución 482/2002 recertificado periódicamente para asegurar la continuidad de nuestra calidad.

## + Experiencia

Contamos con amplia experiencia en la elaboración de vitamínicos/minerales, medicamentos para el alivio del dolor y la salud articular.

A partir del lanzamiento de las marcas Felilax y Nutripet en 1996, hemos seguido desarrollando formas farmacéuticas amigables para ofrecerle tanto al Profesional Veterinario, como a los tutores de animales de compañía, soluciones prácticas en la administración de medicamentos.

En los últimos años, la tenencia de gatos en los hogares ha crecido. Es por ello que seguimos desarrollando productos y líneas farmacéuticas para atender las necesidades específicas de esta especie, convirtiéndonos en un laboratorio líder en **Medicina Cat Friendly**.

## + Compromiso

Continuamos ampliando nuestras líneas de productos y trabajando en la investigación de nuevos desarrollos.

**John Martin**, hace 39 años brindando soluciones innovadoras, prácticas, diferenciadoras y seguras para la **salud y bienestar de perros y gatos**.






**SALUD ARTICULAR**

# Colotrin<sup>®</sup>

CATS

+HA | 



Con  
**cuchara**  
DOSIFICADORA

 80 g



**COMPOSICIÓN:** Glucosamina, clorhidrato 3000 mg; Condroitín, sulfato sódico 2000 mg; Metilsulfonilmetano 5000 mg; Ácido hialurónico, sal sódica 150 mg; Magnesio cloruro, hexahidrato (equivalente a 35 mg de Mg) 300 mg; Zinc sulfato, heptahidrato (equivalente a 159 mg de Zn) 700 mg; Aceite de hígado de bacalao 3000 mg. Excipientes c.s.p. 100 g.

**INDICACIONES:** Condroprotector, condroreparador. Mantiene la integridad anatómica y funcional del cartílago. Previene y retrasa los síntomas de degeneración articular en animales que padecen osteoartritis, ya sea de origen geriátrico u otra causa. El ácido hialurónico contribuye al mantenimiento del líquido sinovial necesario para mejorar la movilidad articular. El MSM posee acción antiinflamatoria, antioxidante y provee de sulfatos para el mantenimiento y reparación de los tejidos articulares. El magnesio y el zinc ayudan al fortalecimiento de las articulaciones. Indicado para el tratamiento de la osteoartritis primaria o secundaria y otros procesos inflamatorios de las articulaciones como la sinovitis, artritis no infecciosa, condropatías, hidrartrosis, enfermedad articular degenerativa y la tendinitis.


**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:** Administrar por vía oral, una vez por día. La duración del tratamiento inicial no debe ser inferior a 45-60 días. Posteriormente, según criterio del Profesional Veterinario actuante, puede ser administrado para el mantenimiento de la salud articular por períodos prolongados y sin necesidad de interrupción.

**PRESENTACIÓN:** Pomo 80 g.

# Colotrin<sup>®</sup>

DOGS

+HA 



Con  
**cuchara**  
DOSIFICADORA

 **80 y 200 g**



**COMPOSICIÓN:** Glucosamina, clorhidrato 3000 mg; Condroitín, sulfato sódico 2000 mg; Metilsulfonilmetano 5000 mg; Ácido hialurónico, sal sódica 150 mg; Magnesio cloruro, hexahidrato (equivalente a 35 mg de Mg) 300 mg; Zinc sulfato, heptahidrato (equivalente a 159 mg de Zn) 700 mg; Aceite de hígado de bacalao 3000 mg. Excipientes c.s.p. 100 g.

**INDICACIONES:** Condroprotector, condroreparador. Mantiene la integridad anatómica y funcional del cartílago. Previene y retrasa los síntomas de degeneración articular en animales que padecen osteoartritis, ya sea de origen geriátrico u otra causa. El ácido hialurónico contribuye al mantenimiento del líquido sinovial necesario para mejorar la movilidad articular. El MSM posee acción antiinflamatoria, antioxidante y provee de sulfatos para el mantenimiento y reparación de los tejidos articulares. El magnesio y el zinc ayudan al fortalecimiento de las articulaciones. Indicado para el tratamiento de la osteoartritis primaria o secundaria y otros procesos inflamatorios de las articulaciones como la sinovitis, artritis no infecciosa, condropatías, hidrartrosis, enfermedad articular degenerativa y la tendinitis.

**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:** Administrar por vía oral, una vez por día. La duración del tratamiento inicial no debe ser inferior a 45-60 días. Posteriormente, según criterio del Profesional Veterinario actuante, puede ser administrado para el mantenimiento de la salud articular por períodos prolongados y sin necesidad de interrupción.

**PRESENTACIÓN:** Pomos 80 y 200 g.



 **30 comprimidos**



**COMPOSICIÓN:** Glucosamina, clorhidrato 300 mg; Condroitín sulfato 200 mg; Metilsulfonilmetano 500 mg. Excipientes c.s.p. 3000 mg.

**INDICACIONES:** Condroprotector, condroreparador. La glucosamina en conjunto con el condroitín estimulan la reparación del cartílago articular y disminuyen su degradación. El MSM posee acción antiinflamatoria, antioxidante y provee de sulfatos para el mantenimiento y reparación de los tejidos articulares. Indicado para el tratamiento de la osteoartritis primaria o secundaria y otros procesos inflamatorios de las articulaciones como la sinovitis, artritis no infecciosa, condropatías, hidrartrosis, enfermedad articular degenerativa y la tendinitis.

**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:** Administrar por vía oral.

**Caninos:**

Hasta 10 kg de peso: 1/2 comprimido diario.

Más de 10 kg de peso: 1 comprimido diario.

Para caninos cuyo peso sea superior a 30 kg la dosificación inicial quedará a criterio del Profesional Veterinario.

**Felinos:**

Hasta 5 kg de peso: 1/4 comprimido diario.

Más de 5 kg de peso: 1/2 comprimido diario.

La duración del tratamiento inicial no debe ser inferior a 45-60 días. Posteriormente, según criterio del Profesional Veterinario actuante, puede ser administrado para el mantenimiento de la salud articular por períodos prolongados y sin necesidad de interrupción.

**PRESENTACIÓN:** Estuche con 30 comprimidos.



**DOLOR AINEs**



# Meloxivet<sup>®</sup>

John Martin

gotas



 GOTAS  
SABORIZADAS

 10 ml



**COMPOSICIÓN:** Meloxicam 0,5 mg. Excipientes c.s.p. 1 ml.

**INDICACIONES:** Tratamiento del dolor e inflamación aguda o crónica de cualquier origen, especialmente musculoesquelética. Tratamiento del dolor oncológico y dolor postquirúrgico como único tratamiento o como parte de una terapia multimodal junto con otros analgésicos.

**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:** Administrar por vía oral.

**Caninos:** dosis de ataque de 0,2 mg/kg el primer día. Luego administrar una dosis de 0,1 mg/kg cada 24 horas.

**Felinos:** dosis de 0,1 mg/kg/24 horas por 3 a 5 días y luego 0,1 mg totales cada 24-72 horas. Como guía en la dosificación 0,5 mg = 25 gotas = 1 ml

Se recomienda su administración en razas pequeñas, animales de bajo peso y gatos en los que la aceptación es muy buena.

La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

**PRESENTACIÓN:** Frasco gotero 10 ml.





# DOLOR OPIOIDES

# Tramadol<sup>®</sup>

John Martin comprimidos



## 20 y 120 comprimidos



**COMPOSICIÓN:** Tramadol, clorhidrato 75 mg. Excipientes c.s.p. 1 comp.

### **INDICACIONES:**

Tratamiento del dolor moderado a severo.  
Tratamiento del dolor agudo y crónico.  
Dolor refractario a otros tratamientos.  
Dolor somático y/o visceral.  
En el dolor postquirúrgico.  
Dolor oncológico.

**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:** Administrar por vía oral.

**Caninos:** 1-3 mg/kg dos a tres veces por día.

La dosis equivale a 1 comprimido cada 75-25 kg de peso del animal.

La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

**PRESENTACIÓN:** Estuche con 20 comprimidos. Estuche hospitalario con 120 comprimidos.



 **10 ml**



**COMPOSICIÓN:** Tramadol, clorhidrato 100 mg. Excipientes c.s.p. 1 ml.

### **INDICACIONES:**

Tratamiento del dolor moderado a severo.  
Tratamiento del dolor agudo y crónico.  
Dolor refractario a otros tratamientos.  
Dolor somático y/o visceral.  
En el dolor postquirúrgico.  
Dolor oncológico.

**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:** Administrar por vía oral.

**Caninos y felinos:** 1-3 mg/kg dos a tres veces por día.

Como guía en la dosificación: 100 mg = 30 gotas = 1 ml.

La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

**PRESENTACIÓN:** Frasco gotero 10 ml.

# Tramadol<sup>®</sup>

John Martin

inyectable



 50 ml



**COMPOSICIÓN:** Tramadol, clorhidrato 50 mg. Excipientes c.s.p. 1 ml.

## INDICACIONES:

Tratamiento del dolor moderado a severo.  
Tratamiento del dolor agudo y crónico.  
Dolor refractario a otros tratamientos.  
Dolor somático y/o visceral.  
En el dolor postquirúrgico.  
Dolor oncológico.

**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:** Administrar por vía SC, IM, epidural o EV lenta.

**Caninos y felinos:** 1-3 mg/kg dos a tres veces por día.

**Modo de uso:** para dosificar 1 mg/kg administrar 0,2 ml cada 10 kg; para dosificar 2 mg/kg administrar 0,4 ml cada 10 kg; para dosificar 3 mg/kg administrar 0.6 ml cada 10 kg. La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

**PRESENTACIÓN:** Frasco ampolla 50 ml.



# ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDES

# Prednisol<sup>®</sup>

gotas

 GOTAS  
SABORIZADAS



 15 ml



**COMPOSICIÓN:** Prednisolona 10 mg. Excipientes c.s.p. 1 ml.

**INDICACIONES:** Antiinflamatorio. Antialérgico. Inmunosupresor. Terapia de reemplazo corticosteroide.

**Caninos:** dermatitis y alergias de piel. Desórdenes gastrointestinales, inflamatorios inmunomediados, o alérgicos. Enfermedad respiratoria alérgica o por hipersensibilidad. Inmunosupresión. Complemento en el tratamiento de neoplasias.

**Felinos:** asma y bronquitis alérgica. Desórdenes gastrointestinales. Dermatitis. Gingivitis, estomatitis y procesos de la cavidad bucofaríngea. Inmunosupresión. Complemento en el tratamiento de neoplasias.

**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:** Administrar por vía oral.

**Caninos:** las dosis a administrar pueden variar de acuerdo al cuadro a tratar y oscilan entre 0,5-4 mg/kg/día, equivalentes a 1-8 gotas/kg/día.

**Felinos:** las dosis a administrar pueden variar de acuerdo al cuadro a tratar y oscilan entre 1-4 mg/kg/día, equivalentes a 2-8 gotas/kg/día. Se recomienda su uso especialmente en razas pequeñas, animales de bajo peso y gatos en los que la aceptación es muy buena.

Como guía en la dosificación 10 mg = 20 gotas = 1 ml.

La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

**PRESENTACIÓN:** Frasco gotero 15 ml.



**SALUD HEPÁTICA**





 15 ml



**COMPOSICIÓN:** Acetilmetionina 1500 mg; DL-metionina 1500 mg; Homatropina, metilbromuro 100 mg; Colina, bitartrato 1000 mg; Vitamina B12 1 mg; Extracto fluido de *Cynara scolymus* 5000 mg; Extracto fluido de *Peumus boldus* 3000 mg; Extracto fluido de *Rhamnus purshiana* 2500 mg. Excipientes c.s.p.100 ml.

**INDICACIONES:** Protector hepático, colagogo y colerético natural.

Tratamiento de hepatopatías de diverso origen: hepatitis, lesiones tóxicas, insuficiencias hepáticas, ictericia, espasmos y estasis biliar, con constipación intestinal y meteorismo. Regulación del metabolismo lipídico hepático.

**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:** Administrar por vía oral.

**Caninos y felinos:** 3 gotas/kg. Dosis máxima: 30 gotas totales. Cuando el peso supere los 10 kg, utilizar siempre la dosis máxima.

Administrar cada 12 hs.

Se puede suministrar diluido con agua o solución azucarada.

Como guía en la dosificación 20 gotas = 1 ml.

La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

**PRESENTACIÓN:** Frasco gotero 15 ml.

# Ursoliv®



 **SUSPENSIÓN ORAL  
SABORIZADA**

con **JERINGA DOSIFICADORA**

 **75 ml**



**COMPOSICIÓN:** Ácido ursodesoxicólico 50 mg. Excipientes c.s.p. 1 ml.

**INDICACIONES:** Ursoliv es una suspensión de uso oral saborizada que se indica como tratamiento de patologías hepáticas y biliares inflamatorias **cuando no existe obstrucción biliar.**

Como colerético, cuando existe estasis biliar (colestasis sin obstrucción). En la hepatitis crónica y otras hepatopatías, el ácido ursodesoxicólico puede utilizarse solo o asociado a otras drogas, como antiinflamatorios inmunomoduladores o hepatoprotectores según el protocolo definido para el tratamiento. En la triaditis felina en asociación con otros tratamientos. En el mucocele de la vesícula biliar, con presencia de barro biliar. En la colelitiasis, previene la formación de cálculos en animales con antecedentes de esta patología o con formación de barro biliar recurrente.

Acción litolítica: puede colaborar en la disolución de cálculos pequeños preexistentes, no obstructivos ni calcificados, con un tratamiento lo suficientemente prolongado, de al menos 3 meses.

**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:** La dosis a administrar en perros y gatos es de 10-15 mg/kg/día (0,2-0,3 ml/kg de la suspensión). La dosis total diaria puede administrarse en 1 o 2 tomas, en este último caso separadas por 12 hs. Se recomienda administrar junto con el alimento o a la hora de la alimentación para su mejor acción. La duración del tratamiento quedará a criterio del veterinario actuante y guardará relación con el cuadro que se desea tratar.

**PRESENTACIÓN:** Frasco 75 ml con jeringa dosificadora.

*John Martin*<sup>®</sup>

**CORIVET** <sup>®</sup>  
SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

**Corivet Cia. Ltda. / Distribuidor exclusivo en Ecuador**  
Alemania N30-58 y Av. Eloy Alfaro Edificio  
Solemni oficina 208, Quito  
[www.corivet.com](http://www.corivet.com)

JOHN MARTIN S.R.L.  
[info@john-martin.com.ar](mailto:info@john-martin.com.ar)  
[john-martin.com.ar](http://john-martin.com.ar)

