


VADEMÉCUM

CAT FRIENDLY

John Martin[®]



Somos líderes en el desarrollo de medicamentos con los **principales activos**, en **formas farmacéuticas palatables** y de **fácil administración** para atender las necesidades específicas de esta especie.

Colotrin. **+HA** CATS



Tónico totalTM CATS



Nutripet John Martin



! 80 g

+ COMPOSICIÓN


Glucosamina, clorhidrato 3000 mg; Condroitín, sulfato sódico 2000 mg; Metilsulfonilmetano 5000 mg; Ácido hialurónico, sal sódica 150 mg; Magnesio cloruro, hexahidrato (equivalente a 35 mg de Mg) 300 mg; Zinc sulfato, heptahidrato (equivalente a 159 mg de Zn) 700 mg; Aceite de hígado de bacalao 3000 mg. Excipientes c.s.p. 100 g.

+ INDICACIONES

Condroprotector, condroreparador. Mantiene la integridad anatómica y funcional del cartilago. Previene y retrasa los signos de degeneración articular en animales con osteoartritis de cualquier origen y gerontes.

El ácido hialurónico contribuye al mantenimiento del líquido sinovial necesario para mejorar la movilidad articular. El MSM posee acción antiinflamatoria, antioxidante y provee de sulfatos para el mantenimiento y reparación de los tejidos articulares. El magnesio y el zinc ayudan al fortalecimiento de las articulaciones. Indicado para el tratamiento de la osteoartritis primaria o secundaria y otros procesos inflamatorios de las articulaciones como la sinovitis, artritis no infecciosa, condropatías, hidrartrosis, enfermedad articular degenerativa y la tendinitis.

+ DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Administrar una vez por día. La duración del tratamiento inicial no debe ser inferior a 45-60 días. Posteriormente, según criterio del Profesional Veterinario actuante, puede ser administrado para el mantenimiento de la salud articular por periodos prolongados y sin necesidad de interrupción. 1 cuchara dosificadora (2g)  / gato / día.

+ PRESENTACIÓN

Gatos: Pomo 80 g.

! 80 g

+ COMPOSICIÓN

Taurina 2000 mg; Biotina 0,2 mg; Vitamina A, palmitato 10000 UI; Vitamina D3 1000 UI; Vitamina B1, Tiamina clorhidrato 22 mg; Vitamina B2, Riboflavina 5'- fosfato sódico 5 mg; Vitamina B3, Nicotinamida 30 mg; Vitamina B12, Cianocobalamina 0,04 mg; Vitamina E, acetato 50 mg; Ácido fólico 2 mg; Magnesio cloruro, hexahidrato 300 mg (equivalente a 35,9 mg de Mg); Zinc sulfato, heptahidrato 25 mg (equivalente a 5,7 mg de Zinc); Aceite de hígado de bacalao 3000 mg. Excipientes c.s.p. 100 g.

+ INDICACIONES

Estados fisiológicos de mayor demanda: Pediatria, de gestación y lactancia. Situaciones de estrés o previo a las mismas. Estados carenciales. Soporte nutricional (dietas caseras o deficientes). Complemento del tratamiento en enfermedades infecciosas. Refuerzo del sistema inmunológico. Animales de exposición. Mejora de piel y pelaje. Vehículo de otros medicamentos. Refuerzo positivo en maniobras de consultorio. Animales con paladar selectivo.

+ DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Gatos de todas las edades: administrar por vía oral 1 g de producto/kg/día. Como medida orientativa, una cucharada de café equivale a 2,5 g. La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

+ PRESENTACIÓN

Pomo 80 g.

! 40 g 80 g

+ COMPOSICIÓN

Vitamina A, palmitato 17500 UI (equivalente a 9.72 mg); Vitamina D3 1000 UI (equivalente a 25 µg); Vitamina B1, clorhidrato 32 mg; Vitamina B2, 5-fosfato sódico 3,2 mg; Vitamina B3, nicotinamida 32 mg; Vitamina B6 18 mg; Vitamina B12 35 µg; Vitamina E, acetato 135 mg; Ácido fólico 3,2 mg; L-Lisina, clorhidrato 50 mg; Taurina 50 mg; Calcio, carbonato 360 mg (equivalente a 144 mg de Ca); Magnesio cloruro, hexahidrato 4 mg (equivalente a 0,478 mg de Mg); Manganeseo cloruro, tetrahidrato 18 mg (equivalente a 5 mg de Mn); Potasio, cloruro 3 mg; Potasio, yoduro 6 mg. Excipientes c.s.p. 100 g. Humedad (máx): 11,5%; Grasas (mín): 35,3%; Proteína (mín): 2,3%; Cenizas totales (máx): 6,5%; Fibra cruda (máx): 0,13%; Hidrato de carbono (mín): 43,5%. Calorías: 500 kcal.

+ INDICACIONES

Estados debilitantes: anorexia, caquexia, hiporexia. Animales hospitalizados y/o convalecientes. Neonatología. Recuperación postquirúrgica. Coadyuvante en la recuperación de patologías gastrointestinales. En el ayuno prequirúrgico prolongado para evitar la hipoglucemia.

+ DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Administrar por vía oral. La emulsión alimenticia se prepara en concentración de hasta 40% v/v. Como complemento alimenticio: 6 a 12 gramos equivalentes a 2 cucharaditas de té cada 5 kg de peso. En caso de anorexia total o parcial o estados debilitantes: 1 o 2 cucharadas de sopa cada 5 kg de peso. La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante. Orientativamente se sugiere un mínimo de 15 días.

+ PRESENTACIÓN

Pomo 40 g y 80 g.

Meloxivet®

John Martin gotas



10 ml

+ COMPOSICIÓN
Meloxicam 0,5 mg.
Excipientes c.s.p. 1 ml.

+ INDICACIONES
Tratamiento del dolor e inflamación aguda o crónica de cualquier origen, especialmente musculoesquelética. Tratamiento del dolor oncológico y dolor postquirúrgico como único tratamiento o como parte de una terapia multimodal junto con otros analgésicos.

+ DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Administrar por vía oral.
Dosis de 0,1 mg/kg/24 horas por 3 a 5 días y luego 0,1 mg totales cada 24-72 horas.
Como guía en la dosificación 0,5 mg = 25 gotas = 1 ml
Se recomienda su administración en razas pequeñas, animales de bajo peso y gatos en los que la aceptación es muy buena.
La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

+ PRESENTACIÓN
Frasco gotero 10 ml.

Tramadol®

John Martin gotas



10 ml

+ COMPOSICIÓN
Tramadol, clorhidrato 100 mg.
Excipientes c.s.p. 1 ml.

+ INDICACIONES
Tratamiento del dolor moderado a severo. Tratamiento del dolor agudo y crónico. Dolor refractario a otros tratamientos. Dolor somático y/o visceral. En el dolor postquirúrgico. Dolor oncológico.

+ DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Administrar por vía oral.
1-3 mg/kg/dos a tres veces por día.
Como guía en la dosificación:
100 mg = 30 gotas = 1 ml.
La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

+ PRESENTACIÓN
Frasco gotero 10 ml.

Prednisol®

gotas



15 ml

+ COMPOSICIÓN
Prednisolona 10 mg.
Excipientes c.s.p. 1 ml.

+ INDICACIONES
Antiinflamatorio. Antialérgico. Inmunosupresor. Terapia de reemplazo corticosteroide. Asma y bronquitis alérgica. Desórdenes gastrointestinales. Dermatitis. Gingivitis, estomatitis y procesos de la cavidad bucofaringea. Inmunosupresión. Complemento en el tratamiento de neoplasias.

+ DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Administrar por vía oral.
Las dosis a administrar pueden variar de acuerdo al cuadro a tratar y oscilan entre 1-4 mg/kg/día, equivalentes a 2-8 gotas/kg/día.
Se recomienda su uso especialmente en gatos, razas de perros pequeñas y animales de bajo peso.
Como guía en la dosificación:
10 mg = 20 gotas = 1 ml.
La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

+ PRESENTACIÓN
Frasco gotero por 15 ml.

Hepato

John Martin gotas



 15 ml

+ COMPOSICIÓN

Acetilmetionina 1500 mg; DL-metionina 1500 mg; Homatropina, metilbromuro 100 mg; Colina, bitartrato 1000 mg; Vitamina B12 1 mg; Extracto fluido de Cynara scolymus 5000 mg; Extracto fluido de Peumus boldus 3000 mg; Extracto fluido de Rhamnus purshiana 2500 mg. Excipientes c.s.p.100 ml.

+ INDICACIONES

Protector hepático, colagogo y colerético natural.
Tratamiento de hepatopatías de diverso origen: hepatitis, lesiones tóxicas, insuficiencias hepáticas, ictericia, espasmos y estasis biliar, con constipación intestinal y meteorismo.
Regulación del metabolismo lipídico hepático.

+ DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Administrar por vía oral.
3 gotas/kg. Dosis máxima: 30 gotas totales. Cuando el peso supere los 10 kg, utilizar siempre la dosis máxima.
Administrar cada 12 hs.
Se puede suministrar diluido con agua o solución azucarada.
Como guía en la dosificación 20 gotas = 1 ml.
La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

+ PRESENTACIÓN

Frasco gotero 15 ml.

Ranitidina

John Martin gotas



 30 ml

+ COMPOSICIÓN

Ranitidina, clorhidrato 10 mg. Excipientes c.s.p. 1 ml.

+ INDICACIONES

Indicado para el tratamiento de esofagitis, gastrinoma, gastritis y úlcera gástrica o duodenal. En casos donde se deba disminuir la acidez estomacal.

+ DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Administrar por vía oral.
2-3,5 mg/kg equivalente a 1-2 ml cada 5 kg.
Administrar cada 12 horas.
Se recomienda su uso especialmente en razas pequeñas, animales de bajo peso y gatos en los que la aceptación es muy buena.
Se recomienda iniciar el tratamiento por vía parenteral para luego continuar por vía oral.
Como guía en la dosificación 10 mg = 25 gotas = 1 ml
La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

+ PRESENTACIÓN

Frasco gotero por 30 ml.

Felilax[®] pet



40 g 80 g

+ COMPOSICIÓN

Vaselina sólida 25 g; Lecitina 5 g; Ácido benzoico 0,25 g; Aceite de hígado de bacalao 0,25 g. Extracto de malta c.s.p. 100 g.

+ INDICACIONES

Laxante suave. Lubricante intestinal. Preventivo de la constipación producida por la ingestión de pelos y formación de bolos (tricobezoares).

+ DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Administrar por vía oral.

En la constipación y para remoción de tricobezoares: ½-1 cucharada de té (2-5 g totales), 1 a 2 veces por día. Como preventivo: ¼ -½ cucharada de té (1 a 3 g totales), 2 a 3 veces por semana.

La dosis indicada se podrá administrar al animal colocándola en el dorso de la mano para que la ingiera con el lamido.

+ PRESENTACIÓN

Pomo 40 g.

Ascaricida gotas

John Martin

gotas



15 ml

+ COMPOSICIÓN

Piperazina, biclorhidrato 20 g; Homatropina, metilbromuro 0,1 g. Excipientes c.s.p. 100 ml.

+ INDICACIONES

Antiparasitario interno para caninos y felinos.

Activo contra nematodos: *Toxocara cati*, *Toxocara canis* y *Toxascaris leonina*.

+ DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Administrar por vía oral.

10 gotas/kg o 0,5 ml/kg.

Repetir la dosificación a las 48 horas y a los 15 días posteriores. No se necesita ayuno previo o posterior al tratamiento.

Como guía en la dosificación 200 mg de piperazina, biclorhidrato = 20 gotas = 1 ml.

La duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

+ PRESENTACIÓN

Frasco gotero 15 ml.

block! fipro



15 ml

+ COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contiene: Fipronil 10 g. Agentes de formulación c.s.p.

+ INDICACIONES

Tratamiento, control y prevención de las ectoparasitosis causadas por pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*).

El producto puede ser usado con seguridad en hembras gestantes y lactantes, animales enfermos o debilitados.

+ DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Uso externo.

Aplicar directamente sobre la piel separando el pelo en 2-3 puntos entre la nuca y la cruz.

block! Fipro gatos: Pipeta de 0,50 ml.

Repetir la aplicación cada 28-30 días.

Administrar exclusivamente en felinos mayores a 8 semanas de edad.

+ PRESENTACIÓN

Estuches conteniendo 1 pipeta.

John
Martin®

JOHN MARTIN S.R.L.
info@john-martin.com.ar
john-martin.com.ar



+54 9 11 3316-1969



Laboratoriojohnmartin

